

Vaccinatievoorwaarden hondenhotel 't Hoogstehof

Hondenziekte (ook distemper of ziekte van Carré genoemd)

Kattenziekte (parvovirose)

Hepatitis (adenovirus)

Bovenstaande virussen zitten meestal in een combinatie vaccin.

Bij voorkeur dient de basisvaccinatie in orde te zijn. Bijvoorbeeld vaccinatie op 9w-12w-16w ouderdom met een rappel ten laatste op de leeftijd van 1 jaar. Vervolgens hervaccinatie volgens de bijsluiter van het gebruikte vaccin.

De duur van bescherming is namelijk afhankelijk van het gebruikte vaccin. Nobivac DHP en Versican plus DHP dienen om de drie jaar herhaald te worden, Eurican DAP om de 2 jaar, Canigen CHP en Vanguard CPV moeten jaarlijks herhaald worden.

Indien er geen correcte basisvaccinatie werd toegediend en de hond ouder is dan 4 maanden volstaat een eenmalige vaccinatie. Deze dient minstens 3 weken voor het verblijf in het hondenhotel te worden toegediend.

Vacciecheck: Titerbepaling kan enkel voor bovenstaande virussen. Indien de geldigheid van het vaccin verlopen is, kan er getiterd worden om aan te tonen dat er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn. Het bewijs van titratie dient vergezeld te zijn van een dierenartsenverklaring dat de bescherming garandeert voor de periode van verblijf in het hondenhotel.

Kennelhoestvaccinatie (Parainfluenza én Bordetella bronchiseptica) is ook verplicht!

Op dit moment bestaan er in België 5 geregistreerde vaccins:

- **Nobivac Bbpi:** een éénmalige intranasale (neus) vaccinatie geeft na 72 uur (3 dagen) bescherming tegen Bordetella Bronchiseptica en na 21 dagen tegen Para-influenza. Dit vaccin moet jaarlijks gegeven worden, bij voorkeur 3 weken voor verblijf in het hondenhotel.
- **Eurican Pneumo:** dit is een subcutane injectie met een geïnactiveerd vaccin. De eerste keer moet dit vaccin 2x gegeven worden met een interval van 2 à 3 weken. Bij voorkeur wordt de tweede dosis minstens 7 dagen voor verblijf in het hondenhotel toegediend. Het vaccin moet jaarlijks herhaald worden.

Opmerking: Eurican Pneumo dient niet herhaald te worden indien minder dan één jaar geleden de hond met het intranasale vaccin nobivac BbPi werd gevaccineerd.

- **Nobivac Respira Bb:** dit is een inspuikbaar vaccin dat bescherming biedt tegen Bordetella Bronchiseptica. Basisvaccinatie bestaat uit 2 insputingen met 4 weken interval. De bescherming tegen Bordetella Bronchiseptica begint 2 weken na de insputing. De eerste herhalingsvaccinatie dient ideaal na 7 maanden worden toegediend, daarna jaarlijks. Aangezien dit vaccin géén bescherming geeft tegen Para-influenza moet dit gecombineerd worden met een Para-influenza vaccinatie (bv. Nobivac Pi, Versican Plus Pi). Hiervoor is een basisvaccinatie vereist van 2 toedieningen met een interval van 2 à 3 weken, ideaal 4 weken voor het verblijf in het hondenhotel. Dit vaccin dient eveneens jaarlijks herhaald te worden.
- **Versican plus Bb IN (vroeger Bronchishield):** een éénmalige intranasale (neus) vaccinatie geeft bescherming tegen Bordetella Bronchiseptica 5 dagen na toediening. Het vaccin moet jaarlijks herhaald worden. Aangezien dit vaccin géén bescherming geeft tegen Para-influenza moet dit gecombineerd worden met een Para-influenza vaccinatie (bv. Nobivac Pi, Versican Plus Pi). Hiervoor is een basisvaccinatie vereist van 2 toedieningen met een interval van 2 à 3 weken, ideaal 4 weken voor het verblijf in het hondenhotel. Dit vaccin dient eveneens jaarlijks herhaald te worden.
- **Versican plus Bb Oral:** een éénmalige orale (in de mond) vaccinatie geeft bescherming tegen Bordetella Bronchiseptica 3 weken na toediening. Het vaccin moet jaarlijks herhaald worden. Aangezien dit vaccin géén bescherming geeft tegen Para-influenza moet dit gecombineerd worden met een Para-influenza vaccinatie (bv. Nobivac Pi, Versican Plus Pi). Hiervoor is een basisvaccinatie vereist van 2 toedieningen met een interval van 2 à 3 weken, ideaal 4 weken voor het verblijf in het hondenhotel. Dit vaccin dient eveneens jaarlijks herhaald te worden.

Opgemaakt in overleg met DAP DESNOECK
- onze bedrijfsdierenarts -

03/889 14 14